



Medio:	Boletín Sanitario Semanal
Sección:	Sanidad Internacional
Titular:	<i>“Las familias holandesas ya disponen de un test para detectar si sus hijos consumen drogas”</i>
Fecha:	12 de julio de 2005




Sanidad Internacional


- 

• La Sociedad Europea de Cardiología saca una guía sobre el manejo de la insuficiencia cardiaca aguda. La Sociedad Europea de Cardiología (SEC) ha publicado la primera guía europea de actuación frente a la insuficiencia cardiaca aguda con la finalidad de que se convierta en una herramienta de utilidad en la práctica clínica diaria para enfermos con esta patología. El manual, que ha sido presentado durante el congreso de la SEC, celebrado en Lisboa, es el primero sobre este síndrome elaborado a nivel europeo con impacto internacional e influencia sobre la opinión médica. Con anterioridad, las diversas sociedades científicas internacionales se habían centrado en la insuficiencia cardiaca crónica. Antes esta dolencia, los expertos coinciden en que el tratamiento de acción rápida debe ir encaminado al aporte de oxígeno para restablecer la capacidad respiratoria, la administración de diuréticos, con el objetivo de disminuir el volumen de líquidos en el organismo y facilitar la acción de bombeo del corazón, y el uso de vasodilatadores que ensanchan y relajan las paredes de los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión sobre el corazón y permitiendo a este órgano bombear con más comodidad.
- 

• La polio vuelve a Angola. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado la detección de un caso de polio en Angola, un país donde se había logrado erradicar la enfermedad hace cuatro años. Angola va a desarrollar una campaña nacional de vacunación para finales de esta mes y comienzos de agosto. En la actualidad, según datos de la OMS, sólo un 45 por ciento de los niños del país están cubiertos por esta campaña de vacunación. El año pasado, 5 millones de menores angoleños fueron vacunados.

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush anuncia una aportación de **1.000 millones de euros** para frenar las muertes causadas por la malaria en África como parte de una serie de nuevas iniciativas centradas en los problemas del continente.


- 

• Las familias holandesas ya disponen de un test para detectar si sus hijos consumen drogas. Holanda es otro país europeo en el que se comercializa 'Arifarm-Test', el primer detector de drogas de uso doméstico que ayuda a los padres que sospechan que sus hijos consumen drogas. El test, que fue comercializado en España en 2002 y homologado por la FDA, es de un solo uso, detecta de forma sencilla, fiable y rápida la presencia de sustancias ilegales en el organismo: anfetaminas, éxtasis y ácido, cocaína, opiáceos como la heroína y la morfina, y los derivados del cannabis, como la marihuana y el hachís. En tan sólo 3 minutos, los padres pueden saber si su hijo ha consumido drogas simplemente desplazando el dispositivo sobre una prenda personal impregnada recientemente de sudor.
- 

Los médicos franceses serán evaluados de sus conocimientos cada 5 años. A partir de este mes, los médicos galos están obligados por ley (Ley 13 de agosto 2004 sobre las prácticas profesionales) a someterse a una evaluación de sus conocimientos cada 5 años. La alta autoridad de la salud no será quien supervise dicha evaluación. El objetivo es garantizar la calidad de la atención sanitaria.

La Comisión Europea va a adoptar un plan de acción de **lucha contra la droga** para los próximos cuatro años con el objetivo de bajar los niveles de toxicomanía de la población europea y reducir sus consecuencias socio-sanitarias. En la Unión Europea hay 2 millones de consumidores de sustancias estupefacientes, y cada año mueren más de 3.000 ciudadanos por causas relacionadas con el consumo de drogas.

sumario

- 

• Las familias holandesas ya disponen de un test para detectar si sus hijos consumen drogas. Holanda es otro país europeo en el que se comercializa 'Arifarm-Test', el primer detector de drogas de uso doméstico que ayuda a los padres que sospechan que sus hijos consumen drogas. El test, que fue comercializado en España en 2002 y homologado por la FDA, es de un solo uso, detecta de forma sencilla, fiable y rápida la presencia de sustancias ilegales en el organismo: anfetaminas, éxtasis y ácido, cocaína, opiáceos como la heroína y la morfina, y los derivados del cannabis, como la marihuana y el hachís. En tan sólo 3 minutos, los padres pueden saber si su hijo ha consumido drogas simplemente desplazando el dispositivo sobre una prenda personal impregnada recientemente de sudor.